


Lösningar till tentamen i Kösystem 4 Juni 2010

Problem 1.

a)



b) Snittmetoden ger följande samband: $p_1 = 3p_0, p_2 = \frac{9}{2}p_0, p_3 = \frac{9}{2}p_0, p_4 = \frac{9}{2}p_0$

Summan av alla tillståndssannolikheterna ska bli lika med 1 vilket ger att:

$$p_0 = 2/35, p_1 = 6/35, p_2 = p_3 = p_4 = 9/35$$


c) $60\lambda_{eff} = 60\lambda(1 - p_4) = 60\frac{3}{2}\left(1 - \frac{9}{35}\right) = 60\frac{39}{35} \approx 66.86$ jobb per minut.

d) Medelantalet jobb i kön, N_q , beräknas här enklast som $N_q = p_4$.

Tillämpning av Littles sats ger svaret: $W = \frac{N_q}{\lambda_{eff}} = \frac{9/35}{39/35} = \frac{9}{39} \approx 0.231$ (sek)

Problem 2.

a) $N_s = \lambda_{eff} / \mu$



Tillståndssannolikheterna beräknas enligt samma metod som i Problem 1, vilket ger:

$$p_0 = 16/87, p_1 = 32/87, p_2 = 24/87, p_3 = 12/87, p_4 = 3/87$$

$$N_s = \frac{\lambda_{eff}}{\mu} = \frac{1}{\mu} (4p_0 + 3p_1 + 2p_2 + p_3) = 110/87 \approx 1.26$$

b) Tidsspärren = $p_4 = 3/87 \approx 0.0345$

Anropsspärren = 0 ty $\lambda_4 = 0$

c) $p_2 + p_3 + p_4 = 13/29 \approx 0.45$, dvs 45% av tiden är bägge betjänarna upptagna i medel.

d) Se a).

Problem 3.

a) $T = \frac{1}{\mu(1-\rho)} = \frac{12.5}{\mu}$ vilket ger att $\rho = \frac{\lambda}{\mu} = 11.5/12.5 \approx 0.92$.

i) Om istället betjäningsintensiteten $\mu_1 = 2\mu$ används erhålles: $\rho_1 = \frac{\lambda}{\mu_1} = \frac{\lambda}{2\mu} = 11.5/25 \approx 0.46$

$$T_1 = \frac{1}{\mu_1(1-\rho_1)} = \frac{1}{2\mu(1-\rho_1)} = \frac{12.5/13.5}{\mu} \approx \frac{0.9259}{\mu} \approx 0.074T \text{ (en väsentlig minskning!)}$$

ii) $N = \frac{\rho}{1-\rho} = 11.5$ $N_1 = \frac{\rho_1}{1-\rho_1} = \frac{11.5}{13.5} \approx 0.852$

b) $N_q = \lambda W = \frac{\rho^2}{1-\rho} \leq 2$. Lösningen till detta är att $\rho \leq -1 + \sqrt{3} \approx 0.732$ vilket i sin tur medför att

$$T = \frac{1}{\mu(1-\rho)} \leq \frac{1}{\mu(2-\sqrt{3})} \approx \frac{3.73}{\mu}$$

c) $N_q = \frac{\rho^3}{4-\rho^2}$, $\rho = \lambda/\mu \approx 0.92$ (Rättelse: 3c) ska börja med texten: I a) fördubblades betjäningsintensiteten i ett)

i) $T = \frac{1}{\lambda}(N_q + \rho) = \frac{1}{\mu} \left(\frac{\rho^2}{4-\rho^2} + 1 \right) \approx \frac{1.27}{\mu}$ (sämre än ai))

ii) M/M/2 och $\mu : N_q = \frac{\rho^3}{4-\rho^2} \approx 0.247$, M/M/1 och $\mu_1 = 2\mu : N_q = \frac{\rho_1^2}{1-\rho_1} \approx 0.392$

- iii) M/M/1 med dubblad betjäningsintensitet ger minst T.
M/M/2 med oförändrad betjäningsintensitet ger kortast kö i medel.

Problem 4.

$$a) \quad N_1 = \frac{\rho_1}{1 - \rho_1} = \frac{0.75}{1 - 0.75} = 3 \qquad N_2 = \frac{\rho_2}{1 - \rho_2} = \frac{0.8}{1 - 0.8} = 4$$

$$\lambda_4 = \lambda_1(1 - \beta) + \lambda_2 = 17/4 \qquad N_4 = \frac{\rho_4}{1 - \rho_4} = \frac{17/20}{1 - 17/20} = 17/3 \approx 5.67$$

$$b) \quad T_1 = \frac{N_1}{\lambda_1} = 1, \quad T_2 = \frac{N_2}{\lambda_2} = 2, \quad T_4 = \frac{N_4}{\lambda_4} = 4/3$$

$$i) \quad T_{ut \text{ nod } 4} = \frac{\lambda_1(1 - \beta)(T_1 + T_4) + \lambda_2(T_2 + T_4)}{\lambda_4} \qquad T_{ut \text{ nod } 4} = T_4 + \frac{9/4}{17/4}T_1 + \frac{2}{17/4}T_2 \approx 2.80$$

$$ii) \quad W_1 = T_1 - \frac{1}{\mu_1} = 0.75, \quad W_2 = T_2 - \frac{1}{\mu_2} = 1.6, \quad W_4 = T_4 - \frac{1}{\mu_4} = \frac{17}{15}$$

$$W_{ut \text{ nod } 4} = W_4 + \frac{9/4}{17/4}W_1 + \frac{2}{17/4}W_2 \approx 2.28$$

$$c) \text{ Låt oss beteckna den sökta andelen med } A: \quad A = \frac{\lambda_4}{\lambda_{eff,3} + \lambda_4}$$

$$\lambda_{eff,3} = \lambda_3(1 - p_{4097}) = \beta\lambda_1(1 - y) = 0.75(1 - y) \qquad A = \frac{17/4}{0.75(1 - y) + 17/4}$$

$$d) \quad \lambda_{eff,3} = \beta\lambda_1(1 - y) \qquad N_{s,3} = \frac{\lambda_{eff,3}}{\mu_3} = \sum_{k=1}^{4097} p_k = 1 - x \qquad \lambda_{eff,3} = \beta\lambda_1(1 - y) = \mu_3(1 - x)$$

$$\beta = \frac{4(1 - x)}{3(1 - y)}$$

Problem 5.

$$a) \quad T = \frac{N_1 + N_2 + N_3}{\lambda}, \quad N_i = \frac{\rho_i}{1 - \rho_i}$$

$$\lambda_1 = \lambda + 0.3\lambda_3 \quad \lambda_2 = 0.75\lambda_1 + 0.4\lambda_2 \quad \lambda_3 = 0.7 \cdot 0.6\lambda_2$$

Ur dessa samband erhålles:

$$\lambda_2 = 0.75\lambda_1/0.6 \quad \lambda_1 = \lambda + 0.3 \cdot 0.7 \cdot 0.6\lambda_2$$

$$\lambda_1 = \frac{\lambda}{0.8425} \approx 2.374 \quad \lambda_2 = \frac{2.5}{0.8425} \approx 2.967 \quad \lambda_3 = \frac{105}{84.25} \approx 1.246$$

$$N_1 = \frac{0.4748}{1 - 0.4748} \approx 0.9040 \quad N_2 = \frac{0.2967}{1 - 0.2967} \approx 0.4219 \quad N_3 = \frac{0.3739}{1 - 0.3739} \approx 0.5972$$

$$T = \frac{N_1 + N_2 + N_3}{\lambda} \approx 0.962 \text{ (sek)}$$

$$b) \quad p_A = \frac{\lambda_A}{\lambda} = \frac{0.25\lambda_1}{\lambda} \approx 0.297 \quad p_B = \frac{\lambda_B}{\lambda} = \frac{0.3 \cdot 0.6\lambda_2}{\lambda} \approx 0.267$$

$$c) \quad T = p_A T_A + p_B T_B + p_C T_C \approx 0.962 \quad p_C \approx 0.436$$

$$T_B = T_A + \frac{N_2}{0.75\lambda_1} \approx T_A + 0.237 \quad T_C = T_A + \frac{N_2}{0.75\lambda_1} + \frac{N_3}{\lambda_3} \approx T_A + 0.716$$

$$T_A + p_B 0.237 + p_C 0.716 \approx 0.962 \quad T_A \approx 0.587$$

$$T_C \approx 1.30$$

Problem 6.

$$\lambda = 10, \quad E(X) = 0.05, \quad \rho = \lambda E(X) = 0.5 \quad N = \rho + \frac{\lambda^2 E(X^2)}{2(1-\rho)} = 0.5 + 100E(X^2)$$

a) $W = \frac{N}{\lambda} - E(X) = 10E(X^2) = 10 \cdot 0.05^2 = 0.025$

b)

$$W = 10E(X^2) = 10(V(X) + E(X)^2) \geq 10E(X)^2 = 0.025, \text{ dvs personen har rätt.}$$

c)

$$E(X^2) = \int_0^{0.1} x^2 \cdot 10 dx = 1/300$$

$$W = 10E(X^2) = 1/30 \approx 0.033$$