


Lösningsförslag, Kösystem 26 maj 2014

Uppgift 1

a.

Markovkedjan ser ut så här:



b.

Snittmetoden ger:

$$10p_0 = 5p_1 \Rightarrow p_1 = 2p_0$$

$$10p_1 = 10p_2 \Rightarrow p_2 = p_1 = 2p_0$$

$$10p_2 = 10p_3 \Rightarrow p_3 = p_2 = 2p_0$$

$$10p_3 = 10p_4 \Rightarrow p_4 = p_3 = 2p_0$$

$$10p_4 = 10p_5 \Rightarrow p_5 = p_4 = 2p_0$$

Summan av alla sannolikheter måste vara = 1 vilket ger

$$p_0 + 2p_0 + 2p_0 + 2p_0 + 2p_0 + 2p_0 = 1 \Rightarrow p_0 = \frac{1}{11}$$

c.

Anropsspärren blir

$$\frac{\lambda_5 p_5}{\sum_{i=0}^5 \lambda_i p_i} = \frac{\lambda p_5}{\sum_{i=0}^5 \lambda p_i} = \frac{p_5}{\sum_{i=0}^5 p_i} = p_5 = \frac{2}{11}$$

d.

Man kan använda definitionen av medelvärde:

$$1 \cdot p_1 + 2 \cdot (p_2 + p_3 + p_4 + p_5) = 9 \cdot 2p_0 = \frac{18}{11}$$

Man kan också använda Littles sats:

$$\lambda_{\text{eff}} \cdot E(X) = \sum_{i=4}^5 \lambda_i p_i \cdot E(X) = \lambda \cdot (p_0 + p_1 + p_2 + p_4) \cdot E(X) = \lambda(1 - p_5)E(X)$$

$$= 10 \cdot \left(1 - \frac{2}{11}\right) \cdot \frac{1}{5} = \frac{18}{11}$$

e.

En kund som inte spärras hamnar nästan alltid i den sista köplatsen. Först får kunden vänta på att tre av kunderna som är före den (i kön eller i betjänarna) ska bli färdiga. Det tar i snitt tiden

$$3 \cdot \frac{1}{2\mu}$$

Därefter ska kunden själv betjänas. Det tar i medeltal

$$\frac{1}{\mu}$$


Den sammanlagda tiden blir således

$$3 \cdot \frac{1}{2\mu} + \frac{1}{\mu} = \frac{3}{10} + \frac{1}{5} = \frac{1}{2}$$

Uppgift 2

a.

Markovkedjan för systemet ser ut så här:



Snittmetoden ger

$$5p_0 = p_1 \Rightarrow p_1 = 5p_0$$

$$4p_1 = p_2 \Rightarrow p_2 = 4 \cdot 5p_0 = 20p_0$$

$$3p_2 = p_3 \Rightarrow p_3 = 3 \cdot 20p_0 = 60p_0$$

$$2p_3 = p_4 \Rightarrow p_4 = 2 \cdot 60p_0 = 120p_0$$

Summan av alla sannolikheter är = 1 vilket ger

$$p_0(1 + 5 + 20 + 60 + 120) = 1 \Rightarrow p_0 = \frac{1}{206}$$

Sannolikheten för spärr blir nu

$$\frac{\lambda_4 p_4}{\sum_{i=0}^4 \lambda_i p_i} = \frac{1 \cdot 120p_0}{5 \cdot p_0 + 4 \cdot 5p_0 + 3 \cdot 20p_0 + 2 \cdot 60p_0 + 1 \cdot 120p_0} = \frac{120}{325} \approx 0,37$$

b.

Beräkna först medelantalet kunder i systemet:

$$N = 1 \cdot p_1 + 2 \cdot p_2 + 3 \cdot p_3 + 4 \cdot p_4 = 705p_0$$

Sedan beräknar vi

$$\lambda_{\text{eff}} = \mu \cdot P(\text{upptagen betjänares}) = 1 \cdot (p_1 + p_2 + p_3 + p_4) = 205p_0$$

Sedan ger Littles sats:

$$T = \frac{N}{\lambda_{\text{eff}}} = \frac{705}{205} \approx 3.44$$

c.

Det enda som behövs är att förvandla λ_{eff} från per minut till per timme, det är bara att multiplicera med 60 Svaret blir då

$$60 \cdot 205p_0 = 60 \cdot \frac{205}{206} = 59,71$$

per timme.

d.

$$\lambda_{\text{eff}} \cdot E(X) = \frac{205}{206} \approx 99,5 \%$$

Uppgift 3

a.

Börja med att beräkna medelantal kunder i de olika noderna:

$$\rho_1 = \frac{\lambda_1}{\mu_1} = \frac{5}{6} \Rightarrow N_1 = \frac{\rho_1}{1 - \rho_1} = 5$$

$$\rho_2 = \frac{\lambda_2}{\mu_2} = \frac{10}{20} \Rightarrow N_2 = \frac{\rho_2}{1 - \rho_2} = 1$$

$$\rho_3 = \frac{0,4\lambda_1}{\mu_3} = \frac{2}{20} \Rightarrow N_3 = \frac{\rho_3}{1 - \rho_3} = \frac{1}{9}$$

$$\rho_4 = \frac{\lambda_2 + 0,6\lambda_1}{\mu_4} = \frac{13}{20} \Rightarrow N_4 = \frac{\rho_4}{1 - \rho_4} = \frac{13}{7}$$

$$\rho_5 = \frac{0,5 \cdot (\lambda_2 + 0,6\lambda_1) + 2}{\mu_5} = \frac{17}{40} \Rightarrow N_5 = \frac{\rho_5}{1 - \rho_5} = \frac{17}{23}$$

Därefter använder vi Littles sats:

$$T = \frac{\sum_{i=1}^5 N_i}{\lambda_1 + \lambda_2} \approx 0,58$$

b.

Det finns tre vägar för kunder som lämnar nätet via nod 5:

A: 1 → 3 → 5

B: 1 → 4 → 5

C: 2 → 4 → 5

Antal kunder per tidsenhet som tar dessa vägar är

$$\begin{aligned}\lambda_A &= 0,4\lambda_1 = 2 \\ \lambda_B &= 0,5 \cdot 0,4\lambda_1 = 1,5 \\ \lambda_C &= 0,5\lambda_2 = 5\end{aligned}$$

Medeltiden som en kund tillbringar i en nod är

$$T_i = \frac{N_i}{\lambda_i}$$

I vårt fall blir det

$$\begin{aligned}T_1 &= 1 \\ T_2 &= 1/10 \\ T_3 &= 1/18 \\ T_4 &= 1/7 \\ T_5 &= 2/23\end{aligned}$$

Om vi sätter $\lambda = \lambda_A + \lambda_B + \lambda_C$ så blir medeltiden

$$\frac{\lambda_A}{\lambda} \cdot (T_1 + T_3 + T_5) + \frac{\lambda_B}{\lambda} \cdot (T_1 + T_4 + T_5) + \frac{\lambda_C}{\lambda} \cdot (T_2 + T_4 + T_5) \approx 0,68$$

c.

Littles sats ger oss resultatet

$$\frac{\sum N_i - \sum \rho_i}{\lambda_1 + \lambda_2} \approx 0,41$$

d.

Nod 1 blir överbelastad så utintensiteten från noden blir μ_1 . Ankomstintensiteten till nod 3 blir då

$$\lambda_3 = 0,6\mu_1 = 2,4$$

Det ger

$$\rho_3 = \frac{\lambda_3}{\mu_3} = \frac{3}{25} \Rightarrow N_3 = \frac{\rho_3}{1 - \rho_3} = \frac{3}{22} \approx 0,14$$

Uppgift 4

a.

Ställ upp ett ekvationssystem för ankomstintensiteterna till noderna:

$$\begin{aligned}\lambda_1 &= \lambda + 0,8\lambda_2 + 0,5\lambda_3 \\ \lambda_2 &= 0,5\lambda_1 \\ \lambda_3 &= 0,5\lambda_1\end{aligned}$$

Detta har lösningen

$$\lambda_1 = \frac{20\lambda}{7}$$

$$\lambda_2 = \frac{10\lambda}{7}$$

$$\lambda_1 = \frac{10\lambda}{7}$$

Nu beräknar vi intensiteten med vilken kunder lämnar nätet i punkt A respektive B:

$$\lambda_A = 0,2\lambda_2 = \frac{2\lambda}{7}$$

$$\lambda_B = 0,5\lambda_3 = \frac{5\lambda}{7}$$

Sannolikheten att lämna via punkt A blir då

$$\frac{\lambda_A}{\lambda_A + \lambda_B} = \frac{2}{7}$$

och via B

$$\frac{\lambda_B}{\lambda_A + \lambda_B} = \frac{5}{7}$$

b.

$$\rho_1 = \frac{\lambda_1}{\mu_1} = \frac{20\lambda}{7} \Rightarrow N_1 = \frac{\rho_1}{1 - \rho_1} = \frac{20\lambda}{7 - 20\lambda}$$

$$\rho_2 = \frac{\lambda_2}{\mu_2} = \frac{10\lambda}{7} \Rightarrow N_2 = \frac{\rho_2}{1 - \rho_2} = \frac{10\lambda}{7 - 10\lambda}$$

$$\rho_3 = \frac{\lambda_3}{\mu_3} = \frac{10\lambda}{7} \Rightarrow N_3 = \frac{\rho_3}{1 - \rho_3} = \frac{10\lambda}{7 - 10\lambda}$$

Medeltiden i systemet blir då

$$\frac{N_1 + N_2 + N_3}{\lambda} = \frac{20}{7 - 20\lambda} + \frac{20}{7 - 10\lambda}$$

c.

Medelantal besök i nod 1:


$$\frac{\lambda_1}{\lambda} = \frac{20}{7}$$

Medelantal besök i nod 2 och 3:

$$\frac{\lambda_2}{\lambda} = \frac{\lambda_3}{\lambda} = \frac{10}{7}$$

d.

Markovkedjan ser ut så här:



Ekvationer för flöde-in-flöde-ut ser ut så här:

$$\lambda p_0 = 0,2p_2 + 0,5p_3$$

$$(0,5 + 0,5)p_1 = \lambda p_0 + 0,8p_2 + 0,5p_3$$

$$(0,2 + 0,8)p_2 = 0,5p_1$$

$$(0,5 + 0,5)p_3 = 0,5p_1$$

Dessa ekvationer har lösningen

$$p_0 = \frac{0,7}{0,7 + 4\lambda}$$

$$p_1 = \frac{2\lambda}{0,7 + 4\lambda}$$

$$p_2 = \frac{\lambda}{0,7 + 4\lambda}$$

$$p_3 = \frac{\lambda}{0,7 + 4\lambda}$$

Medelantal kunder i nod i blir nu

$$N_i = 0 \cdot (1 - p_i) + 1 \cdot p_i = p_i$$

Uppgift 5

a.

$$E(X^2) = V(X) + E^2(X) = 0,01 + 0,1^2 = 0,02$$

Insättning i formel och användning av Littles sats ger nu att

$$T = \frac{N}{\lambda} = E(X) + \frac{\lambda E(X^2)}{2(1 - \rho)} = 0,1 + \frac{0,8 \cdot 0,02}{2 \cdot (1 - 0,8)} = \frac{1}{2}$$

b.

Medelantal kunder blir enligt Littles sats tillämpad på betjänares

$$N_s = \lambda \cdot E(X) = \rho = 0,8$$


c.

Den minsta tiden får man när $E(X^2)$ är så liten som möjligt, vilket inträffar när variansen är = 0. Således den deterministiska fördelningen.

Uppgift 6

a.

Markovkedjan ser ut så här:



b.

Ekvationerna (med insatta värden på λ , μ och β) blir

$$p_0 = 0,5p_1$$

$$p_1 = p_2$$

$$p_2 = 2p_3$$

$$p_3 = 3p_4$$

Om man utnyttjar att summan av alla sannolikheter ska vara = 1 så blir lösningen

$$p_0 = \frac{3}{19}$$

$$p_1 = \frac{6}{19}$$

$$p_2 = \frac{6}{19}$$

$$p_3 = \frac{3}{19}$$

$$p_4 = \frac{1}{19}$$

Enligt definitionen av medelvärde blir medelantal upptagna betjänare

$$1 \cdot p_1 + 2 \cdot (p_2 + p_3 + p_4) = \frac{26}{19} \approx 1,37$$

Observera att man inte kan använda Littles sats med antal som får komma in i systemet. En del av de som kommer in i systemet ger ju upp redan innan de kommer fram till betjänarna.

c.

$$2\mu \cdot (p_2 + p_3 + p_4) + \mu \cdot p_1 = \frac{13}{19} \approx 0,68$$

d.

$$\beta \cdot p_3 + 2\beta \cdot p_4 = \frac{5}{19} \approx 0,26$$

e.

Först ska en kund framför den "märkta" kunden försvinna, detta sker med intensiteten $2\mu + \beta$. Därefter ska en kund betjäna färdigt, detta sker med intensiteten 2μ . Sedan ska den märkta kunden själv betjäna, den intensiteten är μ . Den sammanlagda medeltiden för detta blir

$$\frac{1}{2\mu + \beta} + \frac{1}{2\mu} + \frac{1}{\mu} = \frac{7}{2} = 3,5$$