

1. Låt A vara händelsen att en kund kontaktar support-tjänsten inom en vecka och D att ett datorpaket är defekt, då har vi

$$P(D) = 0.05, \quad P(D^*) = 0.95, \quad P(A|D) = 0.90, \quad P(A|D^*) = 0.20.$$

- (a) Sannolikheten att en kund kontaktar telefonsupporten inom en vecka fås med satsen om total sannolikhet till

$$P(A) = P(A|D)P(D) + P(A|D^*)P(D^*) = 0.90 \cdot 0.05 + 0.20 \cdot 0.95 = 0.235.$$

- (b) Den sökta sannolikheten är

$$P(D|A) = \frac{P(D \cap A)}{P(A)} = \frac{P(A|D)P(D)}{P(A)} = \frac{0.90 \cdot 0.05}{0.235} \approx 0.192.$$

2. Låt X vara mängden mjölk i en förpackning. Då är enligt uppgift $X \in N(1.02, 0.02)$

- (a) Sannolikheten att ett paket innehåller mindre än en liter blir

$$P(X < 1.00) = \Phi\left(\frac{1.00 - 1.02}{0.02}\right) = \Phi(-1) = 1 - \Phi(1) = [\text{Tabell 1}] = 1 - 0.8423 = 0.1587.$$

- (b) Om X_i är mängden mjölk i kartong nr i så är den totala mängden i 5 förpackningar $Y = \sum_{i=1}^5 X_i$ och en linjär funktion av normalfördelningar är normalfördelad $Y \in N(E(Y), D(Y))$ där

$$E(Y) = E\left(\sum_{i=1}^5 X_i\right) = \sum_{i=1}^5 E(X_i) = \sum_{i=1}^5 1.02 = 5.10$$

$$V(Y) = V\left(\sum_{i=1}^5 X_i\right) = \sum_{i=1}^5 V(X_i) = \sum_{i=1}^5 0.02^2 = 5 \cdot 0.02^2$$

$$D(Y) = \sqrt{V(Y)} = 0.02 \cdot \sqrt{5}.$$

Den sökta sannolikheten blir

$$\begin{aligned} P(Y \geq 5.15) &= 1 - P(Y < 5.15) = 1 - \Phi\left(\frac{5.15 - 5.10}{0.02 \cdot \sqrt{5}}\right) = 1 - \Phi(1.12) = \\ &= 1 - 0.8686 = 0.1314. \end{aligned}$$

3. Låt X vara livslängden av system A och Y livslängden för system B. För $Exp(\lambda)$ är väntevärdet $1/\lambda$ så vi har $X \in Exp(1/8)$ och $Y \in Exp(1/12)$. Fördelningsfunktionen för en exponentialfördelning med tätheten $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$, $x \geq 0$ är

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt = \int_0^x \lambda e^{-\lambda t} dt = [-e^{-\lambda t}]_0^x = 1 - e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0$$

- (a) Vardera sannolikheten att de två komponenterna går sönder inom tio år fås till

$$P(X \leq 10) = F_X(10) = 1 - e^{-10/8} \approx 0.7135$$

$$P(Y \leq 10) = F_Y(10) = 1 - e^{-10/12} \approx 0.5654$$

- (b) Den komponent som går sönder först bestämmer systemets livslängd. Den sökta sannolikheten blir därför

$$\begin{aligned} P(\min(X, Y) \leq 10) &= 1 - P(\min(X, Y) > 10) = 1 - P(X > 10, Y > 10) = [\text{ober.}] = \\ &= 1 - P(X > 10)P(Y > 10) = 1 - [1 - F_X(10)][1 - F_Y(10)] = \\ &= 1 - e^{-10/8} \cdot e^{-10/12} \approx 0.8755 \end{aligned}$$

vilket vi känner igen som sannolikheten att någon av händelserna $X \leq 10$ och $Y \leq 10$ inträffar.

4. Rita upp det om område i (x, y) -planet där $f_{X,Y}(x, y)$ är större än 0, dvs den triangel som begränsas av linjerna $x = 0$, $y = 0$ och $y = 1 - x$.

- (a) Y 's täthetsfunktion blir

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{x,y}(x, y) dx = \int_0^{1-y} e^{1-x} dx = e [-e^{-x}]_0^{1-y} = e(1 - e^{-(1-y)}) = e - e^y, \quad 0 \leq y \leq 1$$

- (b) och dess väntevärde

$$\begin{aligned} E(Y) &= \int_{-\infty}^{\infty} y f_Y(y) dy = \int_0^1 y(e - e^y) dy = e \int_0^1 y dy - \int_0^1 y e^y dy = \\ &= e \left[\frac{y^2}{2} \right]_0^1 - [y e^y]_0^1 + \int_0^1 e^y dy = \frac{e}{2} - e + [e^y]_0^1 = -\frac{e}{2} + e - 1 = \frac{e}{2} - 1. \end{aligned}$$

Väljer man istället att räkna med Y' fås dess väntevärde till

$$\begin{aligned} E(Y') &= \frac{2e}{1+e} \int_0^1 y dy - \frac{1}{1+e} \int_0^1 y e^y dy = \frac{2e}{1+e} \left[\frac{y^2}{2} \right]_0^1 - \frac{1}{1+e} [y e^y]_0^1 + \frac{1}{1+e} \int_0^1 e^y dy = \\ &= \frac{2e}{1+e} \cdot \frac{1}{2} - \frac{1}{1+e} \cdot e + \frac{1}{1+e} [e^y]_0^1 = 0 + \frac{1}{1+e} (e - 1) = \frac{e - 1}{e + 1}. \end{aligned}$$